

CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH SỞI

TIÊM VẮC XIN PHÒNG SỞI

là biện pháp bảo vệ trẻ

TRƯỚC NGUY CƠ MẮC SỞI



ĐỐI TƯỢNG TIÊM:

**Vùng nguy cơ, vùng đang có ca sởi,
dịch sởi xảy ra**

Trẻ từ đủ 6 tháng đến
dưới 9 tháng tuổi.



Trẻ từ 1 đến 10 tuổi
chưa được tiêm đủ
mũi vắc xin chứa
thành phần sởi theo
quy định.



Nhân viên y tế có
nguy cơ tại cơ sở
khám, điều trị bệnh
nhan sởi chưa được
tiêm đủ mũi vắc xin
chứa thành phần sởi
theo quy định.



Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương
Năm 2025



Cho trẻ tiêm **đủ 02 mũi**
vắc-xin phòng bệnh Sởi.

Mũi 1

khi trẻ **9 tháng tuổi.**

Mũi 2

khi trẻ **18 tháng tuổi.**




Rửa tay thường xuyên
bằng xà phòng
đối với trẻ
và người chăm sóc trẻ.

**Khuyến cáo
phòng bệnh**

SỞI

(Theo Quyết định số 4845/QĐ-BYT
ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế
về việc ban hành "Hướng dẫn
giám sát và phòng chống
bệnh Sởi, Rubella")



Nhà ở, nhà trẻ,
mẫu giáo, phòng học
cần **sạch sẽ,**
thông thoáng.



Thường xuyên **khử trùng**
đồ chơi, dụng cụ học tập
và phòng học
bằng các chất sát khuẩn
thông thường.



Không cho trẻ chùi tay lên mắt, mũi, miệng.

Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với
trẻ mắc Sởi hoặc nghi mắc Sởi.



Khi trẻ có biểu hiện: **sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban**
cần sớm cách ly và **đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất**
để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời.